

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Flurostar 200**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling			Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete och höstkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45/ Endast vårbehandli ng	1			1 L	200 g		
Råg, rågvete, hösthavre och durumvete	Mot örtogräs	Bomspruta	20-31/ Endast vårbehandli ng	1			1 L	200 g		
Vårvete och vårkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	20-39	1			0,75 L	150 g		
Havre	Mot örtogräs	Bomspruta	20-31	1			0,75 L	150 g		
Fodermajs	Mot örtogräs	Bomspruta	13-16	1			1 L	200 g		
Gräsfrö till utsäde, slättervall och betesvall/nyetablerad	Mot örtogräs	Bomspruta	13-30	1			0,75 L	150 g		
Gräsfrö till utsäde, slättervall och betesvall/etablerad	Mot örtogräs	Punktbehand ling	≥31	1			2 L	400 g		

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2015-12-07Diariernr  
5.1.1-B14-00016Aktnr  
F-3419

Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Flurostar 200

Produktkod

Reg nr  
5019

## Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Gräsfrö till utsäde, slåttervall och betesvall/punktbehandlad gröda	Betesdjur får inte släppas på punktbehandlad betesvall tidigare än 3 dagar efter behandling.		
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	