

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Sumi-alpha 5 FW**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning- /metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Raps, rybs, lin och senap.	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	Före blom- ning	3		42	300 mL/ha	15 g/ha		
Korn, havre, vete, råg och rågvete	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	<61	3		30	300 mL/ha	15 g/ha	Dosen får inte överstiga 250 mL produkt/ha i utvecklingsstadium 59-61.	
Potatis	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		3		7	250 mL/ha	12,5 g/ha		
Majs och sockermajs	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		1		60	300 mL/ha	15 g/ha		
Vitkål, rödkål, savoykål och spetskål på friland.	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2		7	300 mL/ha	15 g/ha		
Blomkål, broccoli på friland	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		1		7	120 mL/ha	6 g/ha		
Ärter	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2		30	300 mL/ha	15 g/ha		
Socketbetor, foderbetor, rödbetor	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		3		60	240 mL/ha	12 g/ha		
Gräsfrö till utsäde, gräsmattor och på golfbanor.	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		1			300 mL/ha	15 g/ha		
Tomma växthus och odlingsutrymmen för svamp.	Mot insekts- angrepp	Dimning		1			0,5 mL/m ²	25 mg/m ²		

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2015-12-18Diariernr
5.1.1-B15-00455Aktnr
F-729

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Sumi-alpha 5 FW

Produktkod

Reg nr
3753

Ytterligare villkor

Gröda/område/situation	Ytterligare villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning i stråsäd	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50 %. Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter.	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Produkten får inte användas om det är risk för daggbildning.	Spridning av produkten bör göras nattetid.	
Vid behandling i tomma växthus och odlingsutrymmen för svamp.	Behandling ska göras med automatiserad utrustning. Lokalerna ska vädras omsorgsfullt efter behandling. Återinträde i lokaler där behandling utförts får inte ske inom 24 timmar efter behandlingstidpunkten. Efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddskläder, skyddshandskar och andningsskydd användas vid inträdet. 48 timmar efter behandlingstillfället får återinträde ske utan skyddsutrustning.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Personlig skyddsutrustning vid spridning med bomspruta	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	