

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Syllit 544 SC**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Äpple och päron	Mot svamp- angrepp	Fläktspruta		2	7-10	60	1,25 L/ha	680 g/ha		
Körsbär	Mot svamp- angrepp	Fläktspruta	60 – 79	2	7-10	14	1,25 L/ha	680 g/ha		

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av fläktspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Utformning av spridningsutrustning	Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.	Villkoret är till för att skydda ögonen.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]