

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Turex 50 WP**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹⁾ / säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Äpple, päron, plommon körsbär	Mot fjärilslarver	Sprutning	53-99	3	7		2 kg/ha	1,7·10 ¹³ CFU/ha		
Köksväxter i växthus Tomat, paprika, chili-peppar, aubergine, slanggurka, druvgurka, squash, melon och patisson	Mot fjärilslarver	Sprutning		6	7		1 kg/ha	8,5·10 ¹² CFU/ha		
Köksväxter i växthus Salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål (choi-kål), blomkål, broccoli, sareptasenap, kålrabbi	Mot fjärilslarver	Sprutning		3	7		1 kg/ha	8,5·10 ¹² CFU/ha		
Kålväxter på friland; röd-, savoj-, vit-, spetskål, brysselkål och grönkål, salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål (choi-kål), blomkål, broccoli, sareptasenap och kålrabbi	Mot fjärilslarver	Sprutning		3	7		1 kg/ha	8,5·10 ¹² CFU/ha		

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2016-01-07Produktnamn
Turex 50 WPDiarienumr
5.1.1-B15-00463

Produktkod

Aktnr
F-1372Reg nr
4492

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹⁾ /såsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Prydnadsväxter på friland; perenner, blommor och plantskoleväxter	Mot fjärilslarver	Sprutning		6	7		1 kg/ha	8,5·10 ¹² CFU/ha		
Prydnadsväxter i växthus; perenner, blommor och plantskoleväxter	Mot fjärilslarver	Sprutning		6	7		1 kg/ha	8,5·10 ¹² CFU/ha		
Vinbär (röda-, vita och svarta vinbär)	Mot fjärilslarver	Sprutning	0-79	3	7		1 kg/ha	8,5·10 ¹² CFU/ha		X
Jordgubbar på friland och i växthus	Mot fjärilslarver	Sprutning	13-93	3	7		1 kg/ha	8,5·10 ¹² CFU/ha		X
Sallat på friland och i växthus	Mot fjärilslarver	Sprutning	09-99	3	7		1 kg/ha	8,5·10 ¹² CFU/ha		X
Fröproduktion av gran och tall	Mot fjärilslarver	Sprutning	09-99	3	7		2 kg/ha	1,7·10 ¹³ CFU/ha		X

Ytterligare villkor

Gröda/område/situation	Ytterligare villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av fläktspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av växtskyddsmedlet eller sprutvätskan ska lämpliga skyddshandskar, skyddsglasögon/ansiktsskydd samt andningsskydd användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	