

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Signum**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytoxicitetstestningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		
							Produkt	Verksamt ämne	
Gurkväxter på friland; druvgurka, squash, zucchini, melon, pumpa	Mot svampangrepp	Sprutning	13-80	3	7-10	3	500 g/ha	134 g/ha Boskalid 34 g/ha Pyraklostrobin	Rekommenderad spädning: 500 g produkt i 200-600 l vatten/ha
Spenat på friland	Mot svampangrepp	Sprutning	12-33	2	7-14	14	750 g/ha	200 g/ha Boskalid 50 g/ha Pyraklostrobin	Rekommenderad spädning: 750 g produkt i 400-600 l vatten/ha
Blåbär på friland	Mot svampangrepp	Sprutning	51-72	2	7-14	14	1 kg/ha	267 g/ha Boskalid 67 g/ha Pyraklostrobin	Rekommenderad spädning: 1 kg produkt i 400-1000 l vatten/ha

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd