

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Tomahawk 200 EC**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne*		
Höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Vår- behandling	1			0.7 L/ha	140 g/ha		
Vårvete, vårkorn, havre	Mot örtogräs	Bomspruta	12-45 Vår- behandling	1			0.5 L/ha	100 g/ha		
Fodermajs	Mot örtogräs	Bomspruta	13-16	1			0.5 L/ha	100 g/ha		
Fodermajs	Mot örtogräs	Bomspruta	13-16	2	10		0.45 L/ha	90 g/ha		
Slåttervall, betesvall, gräsfrövall	Mot örtogräs	Bomspruta	13-45	1		7	1.8 L/ha	360 g/ha		
Golfbanor	Mot örtogräs	Bomspruta	13-45	1		7	1.8 L/ha	360 g/ha		
Gräsmattor	Mot örtogräs	Bomspruta	13-45	1		7	1.8 L/ha	360 g/ha		

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2016-04-28Diariernr
5.1.1-B12-00466Aktnr
F-3996Produktnamn
Tomahawk 200 EC

Produktkod

Reg nr
5236

Tillstånd och upplysning

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne*		
Gräsmattor (nyanlagd)	Mot örtogräs	Bomspruta	12-15	1		7	1.0 L/ha	200 g/ha		

* 200 g/L Fluroxypyr, verksamt ämne i denna tabell gäller 288 g/L Fluroxypyr meptyl ester

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Utformning av spridningsutrustning	Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.	Villkoret är till för att skydda ögonen.	
Släpp av betesdjur	Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.	Villkoret är till för att skydda betesdjuren.	