

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Butisan Top** – Dispens under perioden 2016-07-25 till 2016-09-30

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karenstid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling	
							Produkt	Verksamt ämne
Höstraps och höstrybs	Mot baldersbrå, blåklint och vallmo	Bomspruta	00-12	1			2,0 L/ha	750 g/ha metazaklor 250 g/ha kvinmerak

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning
Åtgärder för skydd av grundvatten	Använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande metazaklor mer än vart 3:e år på samma fält. Den totala dosen under treårsperioden får högst vara 1,0 kg metazaklor/ha.	
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 90 %. Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas till och med 7 dagar efter behandling.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd