

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Lancelot**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utveckling sstadium <sup>1)</sup> /säsong (min- max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne	
Vårvete, vårkorn, havre	Mot örtogräs	Bomspruta	13-32	1			33 g/ha	Florasulam 4,95 g/ha Aminopyralid 9,9 g/ha	
Höstvete, höstrågvete, höstråg, höstkorn	Mot örtogräs	Bomspruta Endast vårbehandling.	23-32	1			33 g/ha	Florasulam 4,95 g/ha Aminopyralid 9,9 g/ha	

Ytterligare villkor – se nästa sida

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

## Tillstånd och upplysning

## Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten ska skyddshandskar användas. Vid hantering av sprutvätskan ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Skydd av efterföljande gröda	Stråsäd, raps, rybs, gräs och majs kan etableras den påföljande växtsäsongen.  Lancelot innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande känsliga grödor inom följande perioder efter behandling med Lancelot: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>14 månader:</b> potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga växter.</li> <li>- <b>24 månader:</b> bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallater.</li> </ul>		
Hantering av halm och gödsel	Behandlad halm bör inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmantel (frostskydd) för tvåhjärtbladiga växter.  Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) innehållande behandlad halm bör inarbetas (nedplöjas) i jorden minst sju månader före etablering av ovan angivna känsliga grödor. Inget särskilt tidsintervall för inarbetning i jorden behövs före sådd av stråsäd, raps, rybs, gräs och majs.  Halm från en behandlad gröda kan användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halmen och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller sådan halm får dock endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk.		