

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Betanal Power**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

| Gröda/område/situation | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklingsstadium ¹⁾ /säsong (min-max) | Max antal behand- lingar/år | Behandlings- intervall (dygn) | Karens tid (dygn) ²⁾ | Max dos vid varje behandling | | |
|---|--------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | |
| Plantskoleväxter (inklusive skogsplantskoleväxter) på friland | Mot örtogräs | Bomspruta | Tidigast 3 veckor efter sådd | 3 | 7-14 | | 0,6 L/ha | 96 g/ha fenmedifam 96 g/ha desmedifam | Rekommenderad vattenmängd: 200-1200 L/ha |
| Plantskoleväxter (inklusive skogsplantskoleväxter) i växthus | Mot örtogräs | Bomspruta | Tidigast 3 veckor efter sådd | 1 | | | 0,18 mL/m ² | 28,8 mg/m ² fenmedifam 28,8 mg/m ² desmedifam | Rekommenderad vattenmängd: 200-1200 L/ha |

Ytterligare villkor

| | Villkor | Anmärkning |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| Utformning av växthus | Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. | Omfattar inte tunnelodling. |

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd