

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Tombo**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne	
Höstvete, höstråg och höstrågsvete	Mot ogräs	Bomspruta	21-32 Endast vårbehandling	1			200 g/ha	10 g pyroxsulam/ha 10 g aminopyralid/ha 5 g florasulam/ha	
Vårvete	Mot ogräs	Bomspruta	21-32	1			150 g/ha	7,5 g pyroxsulam/ha 7,5 g aminopyralid/ha 3,75 g florasulam/ha	

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vinnanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vinnanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom”.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Skydd av efterföljande gröda	Stråsåd, raps, rybs, gräs och majs kan etableras den påföljande växtsäsongen. Tombo innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande känsliga grödor inom följande perioder efter behandling med Tombo: - 14 månader: potatis och andra solanumarter, sockerbeter, morötter, lök och andra flockblommiga växter. - 24 månader: bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallater.		

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2016-10-27Diariernr
5.1.1-B15-00282Aktnr
F-4255

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Tombo

Produktkod

Reg nr
5267

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Hantering av halm och gödsel	<p>Behandlad halm bör inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmantel (frostskydd) för tvåhjärtbladiga växter.</p> <p>Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) innehållande behandlad halm bör inarbetas (nedplöjas) i jorden minst sju månader före etablering av ovan angivna känsliga grödor. Inget särskilt tidsintervall för inarbetning i jorden behövs före sådd av stråsäd, raps, rybs, gräs och majs.</p> <p>Halm från en behandlad gröda kan användas som foder eller strö i det egna jordbruket.</p> <p>Halmen och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller sådan halm får dock endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk.</p>		