

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Floramite 240 SC**

### Användning och syfte

| Gröda/område/situation            | Syfte                       | Behandlings-<br>utrustning/<br>metod | Utvecklingsstadium <sup>1)</sup><br>/säsong<br>(min-max) | Max antal<br>behand-<br>lingar/år | Behandlings-<br>intervall<br>(dygn) | Karenstid<br>(dygn) <sup>2)</sup> | Max dos vid varje behandling |                       | Ändring <sup>3)</sup> |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   |                             |                                      |  |                                   |                                     |                                   | Produkt                      | Verksamt<br>ämne      |                       |
| Prydnadsväxter och<br>plantskolor | Mot angrepp av<br>kvalster. | Sprutning                            |  | 2                                 |                                     |                                   | 0,6 L/ha                     | 144 g/ha              |                       |
| Jordgubbar                        | Mot angrepp av<br>kvalster. | Sprutning                            | <85  | 2                                 |                                     | 3                                 | 0,6 L/ha                     | 144 g/ha              |                       |
| Gurka och tomat i<br>växthus      | Mot angrepp av<br>kvalster. | Sprutning                            |  | 2                                 |                                     | 1                                 | 80 mL/ m <sup>2</sup>        | 19,2 g/m <sup>2</sup> |                       |

### Ytterligare villkor

|  | Villkor  | Anmärkning   | Ändring <sup>3)</sup> |
|--|--|--|-----------------------|
| Åtgärder för skydd av<br>miljö           | Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".<br>Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan. | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet. |                       |
| Personlig<br>skyddsutrustning            | Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar, skyddskläder och andningsskydd användas.<br>Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas.   | Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.              |                       |
| Vid återinträde i<br>behandlade utrymmen | Lokalerna ska vädras omsorgsfullt efter behandling.<br>Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.  | Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.              |                       |
| Utformning av växthus                    | Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.  | Omfattar inte tunnelodling.  |                       |

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]