

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Proxanil**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne	
Potatis	Mot potatisbladmögel <i>Phytophthora infestans</i>	Bomspruta	21-95	6	7	14	2,5 L/ha	0,838 kg propamokarb/ha ⁴⁾ 0,125 kg cymoxanil/ha	

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴⁾ Dosen avser den fria formen av propamokarb (ej HCl-saltet)