

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Plenum 50 WG**

Användning och syfte

Gröda/område/ situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne	
Gurka i växthus	Mot insektsangrepp	Sprutning		3	10-14	7	0,072 g/m ²	0,036 g/m ²	
Tomat i växthus	Mot insektsangrepp	Sprutning		3	10-14	3	0,072 g/m ²	0,036 g/m ²	
Sallat i växthus	Mot insektsangrepp	Sprutning		3	10-14	21	0,04 g/m ²	0,02 g/ m ²	
Raps och rybs	Mot insektsangrepp	Bomspruta	51-59	1			0,15 kg/ha	0,075 kg/ha	
Prydnadsväxter i växthus	Mot insektsangrepp	Sprutning		3	10-14		0,072 g/m ²	0,036 g/m ²	

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av växtskyddsmedlet ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Vid kontakt med behandlade växtdelar vid återinträde i växthus inom 48 timmar ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter.	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda. Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in. Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid spridning ska ett vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd".		
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.		

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]