

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Mustang Forte**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Vårkorn, vårvete, vårhavre	Mot örtogräs	Bomspruta	13-20	1			300 mL/ha	3 g aminopyralid/ha 1,5 g florasulam/ha 54 g 2,4-D/ha	Endast en applicering per gröda och odlingssäsong.	
Vårkorn, vårvete, vårhavre	Mot örtogräs	Bomspruta	21-32	1			750 mL/ha	7,5 g aminopyralid/ha 3,75 g florasulam/ha 135 g 2,4-D/ha	Endast en applicering per gröda och odlingssäsong.	
Höstvete, höstråg, höstrågvetet och höstkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	21-32 Endast vårbehandling.	1			1 L/ha	10 g aminopyralid/ha 5 g florasulam/ha 180 g 2,4-D/ha		

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom”.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2016-12-12Diariernr
5.1.1-B16-00346Aktnr
F-4273

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Mustang Forte

Produktkod

Reg nr
5266

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Skydd av efterföljande gröda	<p>Stråsäd, raps, rybs, gräs och majs kan etableras den påföljande växtsäsongen.</p> <p>Mustang Forte innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande känsliga grödor inom följande perioder efter behandling med Mustang Forte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 månader: potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga växter. - 24 månader: bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallater. 		
Hantering av halm och gödsel	<p>Behandlad halm bör inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmantel (frostskydd) för tvåhjärtbladiga växter.</p> <p>Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) innehållande behandlad halm bör inarbetas (nedplöjas) i jorden minst sju månader före etablering av ovan angivna känsliga grödor. Inget särskilt tidsintervall för inarbetning i jorden behövs före sådd av stråsäd, raps, rybs, gräs och majs.</p> <p>Halm från en behandlad gröda kan användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halmen och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller sådan halm får dock endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk.</p>		