

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Saracen Delta**

Användning och syfte

Gröda/område/ situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete	Mot ört- ogräs	Bomspruta	20-29	1	-	-	0,075 L/ha	37,5 g/ha Diflufenican 3,75 g/ ha Florasulam	Endast vårapplacering.	
Höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete	Mot ört- ogräs	Bomspruta	30-32	1	-	-	0,1 L/ha	50 g/ha Diflufenican 5,0 g/ha Florasulam	Endast vårapplacering.	
Vårvete, vårkorn	Mot ört- ogräs	Bomspruta	20-29	1	-	-	0,075 L/ha	37,5 g/ha Diflufenican 3,75 g/ ha Florasulam	Endast vårapplacering.	
Vårvete, vårkorn	Mot ört- ogräs	Bomspruta	30-32	1	-	-	0,1 L/ha	50 g/ha Diflufenican 5,0 g/ha Florasulam	Endast vårapplacering.	
Gräs för utsädesproduktion	Mot ört- ogräs	Bomspruta	20-29	1	-	-	0,075 L/ha	37,5 g/ha Diflufenican 3,75 g/ ha Florasulam	Endast vårapplacering. Gräsfröhalm får inte användas som foder.	
Gräs för utsädesproduktion	Mot ört- ogräs	Bomspruta	30-32	1	-	-	0,1 L/ha	50 g/ha Diflufenican 5,0 g/ha Florasulam	Endast vårapplacering. Gräsfröhalm får inte användas som foder.	

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]