

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **CDQ SX**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Vårvete, vårkorn	Mot ogräs	Bomspruta	11-39	1			27 g/ha	3,0 g/ha metsulfuronmetyl 6,0 g/ha tribenuronmetyl		
Havre	Mot ogräs	Bomspruta	11-30	1			18 g/ha	2,0 g/ha metsulfuronmetyl 4,0 g/ha tribenuronmetyl		X
Höstvet, råg, höstrågvet	Mot ogräs	Bomspruta	20-39 endast vårbehandling	1			27 g/ha	3,0 g/ha metsulfuronmetyl 6,0 g/ha tribenuronmetyl		
Höstkorn	Mot ogräs	Bomspruta	20-30 endast vårbehandling	1			27 g/ha	3,0 g/ha metsulfuronmetyl 6,0 g/ha tribenuronmetyl		X

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]