

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Folpan 500 SC**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne	
Vete	Svartpricksjuka ( <i>Septoria tritici</i> )	Bomspruta	30-59	2	7-10	42	1,5 L/ha	750 g/ha	Behandling förväntas inte ge full effekt. Behandling måste utföras innan angreppet är omfattande om behandling ska ha effekt.
Korn	Sköldfläcksjuka ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	Bomspruta	30-59	2	7-10	42	1,5 L/ha	750 g/ha	Behandling förväntas inte ge full effekt. Behandling måste utföras innan angreppet är omfattande om behandling ska ha effekt.

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Vid spridning	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoren är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]