

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Betasana SC**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling			Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Sockerbetor, foderbetor och rödbetor.	Mot örtogräs	Bandspruta	10-18	3	7-10	90	1 L/ha	160 g/ha	Betblasten får inte användas till foder.	
Sockerbetor, foderbetor och rödbetor.	Mot örtogräs	Bomspruta	12-18	3	7-10	90	0,7 L/ha	112 g/ha	Betblasten får inte användas till foder.	
Etablerade odlingar av jordgubbar på friland och i tunnelodling	Mot örtogräs	Bandspruta	≤60 >90	3	6-8		1 L/ha	160 g/ha	Produkten får användas före blomning samt efter skörd.	
Nyplanteringar av jordgubbar på friland och i tunnelodling	Mot örtogräs	Bandspruta		3	6-8		1 L/ha	160 g/ha	Skörden får inte gå till konsumtion.	

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten och sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoren är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.	Omfattar inte växthus.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3)</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]