

Villkor för användning av **Cabrio Duo**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne	
Gurkväxter med ätligt skal (slanggurka, druvgurka, squash och zucchini) på friland	Mot bladmögel	Bomspruta	11-89	3	7-10	1	2,5 L/ha	100 g pyraklostrobin/ha 180 g dimetomorf/ha	
Sallat (huvudsallat, bladsallat, isbergssallad, bindsallat och romansallat) på friland	Mot bladmögel	Bomspruta	10-49	3	7-10	7	2,5 L/ha	100 g pyraklostrobin/ha 180 g dimetomorf/ha	
Kepalök, vitlök och schalottenlök på friland	Mot bladmögel	Bomspruta	13-48	3	7-10	7	2,5 L/ha	100 g pyraklostrobin/ha 180 g dimetomorf/ha	

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbrukspruta med bom”.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]