

Villkor för användning av **GF-2573**

Användning och syfte

| Gröda/område/situation | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max) | Max antal behand- lingar/år | Behandlings- intervall (dygn) | Karens tid (dygn) ²⁾ | Max dos vid varje behandling | | Ändring ³⁾ |
|--|-----------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | |
| Höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete | Mot örtogräs | Bomspruta | 11-22 | 1 | | | 0,4 L/ha | 3,1 g/ha halauxifen- metyl | |
| Höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete | Mot örtogräs | Bomspruta | 23-45 Endast vårbehandling | 1 | | | 0,8 L/ha | 6,2 g/ha halauxifen- metyl | Mellan BBCH 23-29 får max dosen inte överstiga 0,4 L produkt/ha. |
| Vårvete och vårkorn | Mot örtogräs | Bomspruta | 13-45 | 1 | | | 0,8 L/ha | 6,2 g/ha halauxifen- metyl | Mellan BBCH 13-29 får max dosen inte överstiga 0,4 L produkt/ha |

Ytterligare villkor

| | Villkor | Anmärkning | Ändring ³⁾ |
|--|---|---|-----------------------|
| Åtgärder för skydd av miljö vid spridning | Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet. | |
| Personlig skydds- utrustning | Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas. | Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | |

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]