

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Conserve** Dispens under perioden 2017-06-19 till 2017-10-16

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling	
							Produkt	Verksamt ämne
Björnbär och hallon på friland och i tunnel	Mot <i>Drosophila</i> <i>suzukii</i>	Bomspruta, fläktspruta, ryggspruta	13-45	2	10	3	0,8 l/ha	96 g/ha
Blåbär, röda och vita vinbär på friland och i tunnel	Mot <i>Drosophila</i> <i>suzukii</i>	Bomspruta, fläktspruta, ryggspruta	13-45	2	7	3	0,8 l/ha	96 g/ha

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta.	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50 %. Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av fläktspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling". Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50 %. Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd