

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Ariane S**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklingsstadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne	
Vårveete, vårkorn, vårråg och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	21-31	1			2,5 L/ha	500 g/ha MCPA 100 g/ha fluroxipyr 50 g/ha klopyralid	
Höstveete, höstkorn, råg och rågveete	Mot örtogräs	Bomspruta	21-31 Endast vårbehandling	1			3 L/ha	600 g/ha MCPA 120 g/ha fluroxipyr 60 g/ha klopyralid	
Betesvall	Mot örtogräs	Bomspruta	21-31	1		30	2,5 L/ha	500 g/ha MCPA 100 g/ha fluroxipyr 50 g/ha klopyralid	
Gräsfrö till utsäde	Mot örtogräs	Bomspruta	21-31	1			2,5 L/ha	500 g/ha MCPA 100 g/ha fluroxipyr 50 g/ha klopyralid	
Gräs/färdigproduktion av gräsmatta, så kallad gräsmatteodling	Mot örtogräs	Bomspruta	21-31	1		30	2,5 L/ha	500 g/ha MCPA 100 g/ha fluroxipyr 50 g/ha klopyralid	

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]