

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Pixxaro EC**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	23-45 Endast vårbehandling	1			500 mL/ha	6 g/ha halauxifen-metyl 140 g/ha fluroxypyr ⁴⁾		
Vårvete och vårkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	13-45	1			350 mL/ha	4,4 g/ha halauxifen-metyl 98 g/ha fluroxypyr ⁴⁾		

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten ska skyddshandskar och skyddsglasögon användas. Vid hantering av sprutvätskan ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet	

¹⁾ BBCH

²⁾ Tid mellan sista behandling och skörd

³⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴⁾ Beräknat från mängden Fluroxypyr -1-metylheptylester som ingår i produkten