

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **RATIO Super SX**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne	
Vårvede, vårkorn och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	11-39	1			30g/ha	7,2 g /ha tribenuron ⁴⁾ 7,2 g/ha tifensulfuron ⁵⁾	Användning får även ske i stråsäd med insädd av vall.
Höstvede, höstkorn, höstråg och rågvete.	Mot örtogräs	Bomspruta	20-39 Endast vår- behandling	1			30g/ha	7,2 g /ha tribenuron ⁴⁾ 7,2 g/ha tifensulfuron ⁵⁾	Användning får även ske i stråsäd med insädd av vall.

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

¹⁾ BBCH

²⁾ Tid mellan sista behandling och skörd

³⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴⁾ Dosen motsvarar 7,5 g/ha tribenuronmetyl

⁵⁾ Dosen motsvarar 7,5 g /ha tifensulfuronmetyl